

Éléments de management neo-natal

Naître est le plus grand stress de l'existence ...

En effet, pour un nouveau-né fraîchement sorti du ventre de sa mère, les adaptations à entreprendre sont nombreuses : c'est le premier apprentissage de l'autonomie.

Et n'oublions pas que les jeunes ovins et caprins sont particulièrement sensibles au microbisme ambiant. Les périodes de naissances sont ainsi des moments particulièrement critiques durant lesquels la vigilance de l'éleveur est de mise ! Les principales affections rencontrées par le nouveau-né dans les heures / jours qui suivent sa naissance sont au nombre de 4. Elles définissent le « quatuor » du jeune animal. D'autres éléments peuvent bien entendu interférer avec la survie de celui-ci et il ne s'agit pas toujours d'agents infectieux. Les accidents (noyade, écrasement par la mère, ...) sont également rencontrés.

1. Le jeune animal qui souffre de troubles respiratoires peut présenter des signes variables allant de la toux jusqu'à la détresse respiratoire (tirage des flancs).

Risque n°1: Une altération de la croissance, une infection chronique voire de la mortalité

CAUSE(S) POSSIBLE(S):

Il souffre d'une infection virale et/ou bactérienne.

- !** La présence de poussières, le manque de renouvellement d'air dans le bâti, l'humidité sont des facteurs qui peuvent impacter grandement la santé respiratoire.

2. Le jeune animal qui a « du mal à démarrer » se maintient souvent couché dans la loge, sans énergie. Il ne se lève pas ou avec difficultés.

Risque n°1: Un dépérissement rapide lié au manque de consommation de lait maternel

CAUSE(S) POSSIBLE(S):


- Sa mère ne s'en occupe pas, elle n'a pas (assez) de lait.
- Le jeune a froid.
- La mise-bas a été longue, difficile.
- Il souffre d'une infection.
- ...

Il pompe

Il tousse

Il a de la diarrhée

Il a le ventre gonflé



Il a du mal à démarrer

Il boite

Il a des gros genoux

3. Les troubles digestifs sont les plus fréquemment rencontrés et très souvent marqués par de la diarrhée. La constipation est plus rare et essentiellement d'origine alimentaire.

Risque n°1: Une déshydratation rapide et un risque de transmission élevé

CAUSE(S) POSSIBLE(S):

- Le jeune a bu trop de lait.
- Il souffre d'une infection virale et/ou bactérienne.
- Il souffre d'une infestation parasitaire.

- !** L'origine de la diarrhée peut être très variée. Pour la traiter de manière efficace, il est indispensable de tirer au clair quel(s) est/sont le(s) agent(s) pathogène(s) impliqué(s).

4. Le cordon ombilical fraîchement rompu est une porte d'entrée pour les pathogènes présents dans le milieu. Cette remontée de microbes concourt au risque de septicémie.

Risque n°1: Une mortalité en cas de septicémie mais aussi des lésions d'apparition tardive

L'observation de boiteries et d'inflammation des articulations au jeune âge peut parfois être mise en relation avec une infection passée du cordon ombilical. Il s'agit de lésions post-septiciques.

- !** La qualité de la litière (hygiène, épaisseur, type de substrat, humidité et température) influence véritablement la persistance et le développement de germes dans l'environnement.

Les nouveau-nés devraient systématiquement être accueillis dans les meilleures conditions d'hygiène qui soient et dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réservé(e) à leur intention. L'idée de « maternité » doit dépasser les murs de l'hôpital. La surveillance et la facilité d'intervention de l'éleveur n'en seront que facilitées.

Une question ?

Tel : 083 23 05 15 (Option 4) - Email : francois.claine@arsia.be