

# 50 Nuancen eines Fußes



Die Fußkrankungen sind bei den kleinen Wiederkäuern zahlreich und beschränken sich nicht nur auf die «böartige Klauenseuche oder Moderhinke». Sie sind unterschiedlichen Ursprungs, betreffen verschiedene Bereiche des Fußes und sind durch spezifische Symptome gekennzeichnet. Ihre Gemeinsamkeiten: sie verursachen Beschwerden oder sogar Schmerzen und die Ursache ist sehr häufig infektiöser Natur. Diese Erkrankungen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denn die Auswirkungen auf die Gesundheit, den Komfort und die Produktivität des Tieres sind groß!


## Eine Fußkrankung kann sich äußern durch

- Lahmheit einer oder mehrerer Gliedmaßen
- fehlendes Auftreten einer oder mehrerer Gliedmaßen
- eine Fortbewegung des Tieres auf den Knien
- Schwierigkeiten bei der Bewegung
- verminderter Appetit und Abmagerung

## 3 von 4 Fußkrankheiten haben eine infektiöse Ursache, aber ...


Ernährungsstörungen und Mangel / Defizite an Spurenelementen können die Gesundheit der Klauen beeinträchtigen!

## Übersicht der häufigsten Erkrankungen



### Digitale Dermatitis

- **Symptom(e):** deutliche Lahmheit
- **Befallene Region:** oberer Teil der Klaue
- **Ursprung:** bakteriell
- **Prädisponierende Faktoren:** warme und feuchte Einstreu, metabolische Azidose



Digitale Dermatitis

### Zwischenzehendermatitis


- **Symptom(e):** unbeständige Lahmheit, Rötung und Nässen zwischen den Klauen
- **Befallene Region:** zwischen den Klauen
- **Ursprung:** bakteriell
- **Prädisponierende Faktoren:** warme und feuchte Einstreu



Zwischenzehendermatitis

### Abszess

- **Symptome:** deutliche Lahmheit
- **Befallene Region:** Sohle (Fußsohle)
- **Ursprung:** bakteriell
- **Prädisponierende Faktoren:** Verletzung des Fußes




© Farm Health Online (2020)

### Granulom

- **Symptome:** unbeständige Lahmheit
- **Befallene Region:** Klauenspitze
- **Ursprung:** entzündliche Reaktion
- **Prädisponierende Faktoren:** Verletzung des Fußes

### Degeneration / Krankheit des Horns

- **Symptome:** seltene Lahmheit, Hornbruch
- **Befallene Region:** Hufkapsel
- **Ursprung:** Defizit / Mangel an Spurenelementen
- **Prädisponierende Faktoren:** Mineralstoffergänzung unzureichend



© Farm Health Online (2020)

## Und die Moderhinke?

Die Moderhinke ist eine Zwischenzehendermatitis, die durch andere Bakterien kompliziert wird, die die Verletzungen des Fußes verstärken, d. h. eine Ablösung der Klaue, die in den schlimmsten Fällen bis zum völligen Abfallen der Klaue führen kann.


Auch wenn es "gutartige" Formen der Moderhinke gibt und andere, die deutlich aggressiver sind, ist diese Fußkrankung für das Tier schmerzhaft und muss schnell behandelt werden, um eine Ausbreitung auf die Tiergruppe / den Bestand zu verhindern.

Je nach Schweregrad der Verletzungen ... Individuen mit aggressiven Formen der Moderhinke oder mit Rückfällen sollten systematisch reformiert werden

Die befallenen Tiere sollen vom Rest der Gruppe getrennt werden, um die Ansteckung zu vermeiden

- Einhaltung einer Quarantäne bei der Einführung
- Regelmäßiges Trimmen und Pflegen der Füße
- Erhalt einer sauberen und trockenen Einstreu
- Gang durch ein Fußbad

Je nach Grad des Befalls: lokale Behandlung oder systemische Behandlung



**Gewisse Tiere sind symptomlose Träger der Bakterien, die für die Moderhinke verantwortlich sind: sie weisen somit keine Anzeichen der Krankheit auf.**