

50 nuances de pied



Les atteintes du pied sont nombreuses chez les petits ruminants et ne se résument pas au seul « piétin ». D'origines différentes et touchant des zones distinctes du pied, elles se caractérisent par des symptômes précis. Leurs points communs : l'inconfort voire la douleur générée et une cause très fréquemment infectieuse. Des atteintes à ne pas prendre à la légère tant l'impact sur la santé, le confort et la productivité de l'animal est grand !


Une atteinte du pied peut se traduire par

- de la boiterie d'un ou de plusieurs membres
- une absence de poser d'un ou de plusieurs membres
- un déplacement de l'animal sur les genoux
- des difficultés à se mouvoir
- une baisse de l'appétit et de l'amaigrissement

3 atteintes de pied sur 4 ont une origine infectieuse mais ...


Des désordres alimentaires et des déficiences / carences en oligo-éléments peuvent affecter la bonne santé des onglons !

Panorama des atteintes les plus fréquentes



Dermatite digitée

- **Symptôme(s)** : boiterie marquée
- **Zone atteinte** : haut de l'onglon
- **Origine** : bactérienne
- **Facteur(s) prédisposant(s)** : litière chaude et humide, acidose métabolique




Dermatite interdigitée

- **Symptôme(s)** : boiterie inconstante, rougeur et suintement entre les onglons
- **Zone atteinte** : entre les onglons
- **Origine** : bactérienne
- **Facteur(s) prédisposant(s)** : litière chaude et humide



Abcès

- **Symptôme(s)** : boiterie marquée
- **Zone atteinte** : sole (plante du pied)
- **Origine** : bactérienne
- **Facteur(s) prédisposant(s)** : blessure du pied




Granulome

- **Symptôme(s)** : boiterie inconstante
- **Zone atteinte** : pointe de l'onglon
- **Origine** : réaction inflammatoire
- **Facteur(s) prédisposant(s)** : blessure du pied

Dégénérescence / Maladie de la corne

- **Symptôme(s)** : boiterie rare, cassure de la corne
- **Zone atteinte** : boîte cornée
- **Origine** : déficience / carence en oligo-éléments
- **Facteur(s) prédisposant(s)** : complémentation minérale inadéquate



Et le piétin ?


Le piétin est une dermatite interdigitée qui se complique par l'intervention d'autres bactéries qui accentuent les lésions du pied à savoir un décollement de l'onglon allant jusqu'à sa chute totale dans les cas les plus graves.

S'il existe des formes « bénignes » de piétin et d'autres clairement plus agressives, cette pathologie du pied est source de douleur pour l'animal et doit faire l'objet d'une prise en charge rapide pour éviter son expansion dans le lot / le troupeau.

Certains individus sont porteurs asymptomatiques des bactéries responsables du piétin : ils ne présentent ainsi aucun signe de la maladie.

Selon la sévérité des lésions ... Les individus présentant des formes agressives de piétin ou des récurrences devraient être systématiquement réformés.

Ecarter les animaux atteints du reste du groupe pour éviter la contagion.



- Respect d'une quarantaine à l'introduction
- Parage et entretien régulier des pieds
- Maintien d'une litière propre et sèche
- Passage en pédiluve

Selon le degré d'atteinte : traitement local ou traitement par voie générale