

# DOSSIER SZH




# MEINE CHECKLISTE AM ENDE DER TRÄCHTIGKEIT



## - 6 WOCHEN

**ICH KONTROLLIERE DEN VERFETTUNGSGRAD DER SCHAFE/ZIEGEN (MIND. 15% DER GRUPPE).**



**Ziel:** einen Verfettungsgrad zwischen 3,0 und 3,5 beibehalten

**ICH SORTIERE MEINE GRUPPE(N) TRÄCHTIGER TIERE NACH:**

- dem Verfettungsgrad (Schwelle: 3,0)
- der Wurfgröße bei Auszählung



**Ziel:** die Futtermenge an die Bedürfnisse der Tiere anpassen

**ICH SCHERE DIE SCHAFE.**

**ICH SORGE FÜR EINE ERGÄNZUNG DES FUTTERS MIT MINERALIEN UND VITAMINEN (EMV).**

**KONTROLLPUNKTE**

- Deckung des Energiebedarfs: Dosierung der Beta-Hydroxybutyrate (BOH)
- Ausgewogenheit der Ration und der EMV: Stoffwechselprofil (Makro- und Spurenelemente)

## - 4 WOCHEN

**ICH BEREITE DEN STALL FÜR DIE GRUPPEN VON LÄMMERN/ZICKLEIN VOR.**

- Säubern → Schmutz lösen → Reinigen → Desinfizieren → Hygienebedingte Leerzeit
- Einrichtung des Bereichs «Geburt» ([siehe Infoblatt](#))

**ICH FÜHRE DIE AUFRISCHUNGSIMPFUNG MEINER SCHAFE/ZIEGEN DURCH, UM DEN ANTIKÖRPERGEGHALT IM KOLOSTRUM ZU ERHÖHEN.**



**IMPFUNG**

- Handelt es sich um eine Erstimpfung, sollten zwei Dosen im Abstand von 3 bis 4 Wochen verabreicht werden. Die 1. Impfdosis erfolgt also 7 bis 8 Wochen vor der Geburt.
- Je nach angestrebter Pathologie kann eine Auffrischungsimpfung vor der Bekämpfung ratsam sein

## 0 = GEBURT



**ICH MINIMIERE UND GRUPPIERE DIE EINGRIFFE BEI DEN GRUPPEN TRÄCHTIGER TIERE.**

**WENN ICH EINEN ODER MEHRERE ABORTE FESTSTELLE, VERWENDE ICH DAS PROTOKOLL « FEHLGEBURT »** ([siehe Infoblatt](#))

Eine Frage?  
Tel: 083 23 05 15 (Option 4)  
E-mail: francois.claine@arsia.be

