


## DOSSIER OCC

# MA CHECK-LIST DE FIN DE GESTATION



## - 6 SEMAINES

### JE CONTRÔLE L'ÉTAT D'EMBONPOINT DES BREBIS / CHÈVRES (MIN. 15% DU LOT).



### J'EFFECTUE UN TRI DANS MON / MES LOT(S) DE FEMELLES EN GESTATION SELON:

- l'état d'embonpoint (seuil: 3,0)
- la taille de portée en cas de dénombrement



Objectif: adapter la ration alimentaire aux besoins des individus

### JE PROCÈDE À LA TONTE DES BREBIS.



- Couverture des besoins énergétiques: dosage des Beta-Hydroxybutyrates (BOH)
- Équilibre de ration et du CMV: profil métabolique (macro- et oligoéléments)

## - 4 SEMAINES

### J'ASSURE UNE COMPLÉMENTATION EN MINÉRAUX ET VITAMINES (CMV) DANS L'ALIMENT.

### JE PRÉPARE LE BÂTIMENT À ACCUEILLIR LES LOTS D'AGNELAGES / DE CHEVROTAGES.

- Curage → Décapage → Nettoyage → Désinfection → Vide sanitaire
- Aménagement de la zone « Maternité » ([voir fiche sur notre site](#))

### J'EFFECTUE LE RAPPEL DE VACCINATION DE MES BREBIS / CHÈVRES POUR BOOSTER LES ANTICORPS DANS LEUR COLOSTRUM.

**VACCINATION**

- S'il s'agit d'une primovaccination, deux doses devront être administrées avec un écart de 3 à 4 semaines. La première dose de vaccin sera donc utilisée 7 à 8 semaines avant mise-bas.
- Selon les pathologies visées, le rappel de vaccination peut être conseillé avant la mise à la lutte

## 0 = MISE-BAS

### JE MINIMISE ET REGROUPE LES INTERVENTIONS DANS LE(S) LOT(S) DE FEMELLES GESTANTES.

### EN CAS DE DÉTECTION D'UN OU PLUSIEURS AVORTEMENT(S), J'EMPLOIE LE PROTOCOLE « AVORTEMENT » ([voir fiche sur notre site](#))

