

DOSSIER OCC

AGNELAGES : ASSISTANCE & SOINS AUX NOUVEAU-NÉS



MATÉRIEL DE BASE



- Eau chaude & savon
- Gants
- Lubrifiant
- Tire-agneau ou cordes de mise-bas
- Pessaire ou bande vaginale
- Désinfectant (pot trempeur ou spray)
- Thermomètre
- Biberon
- Sonde pélican

QUAND INTERVENIR ?

RÈGLE DES 3X30


Je prends la décision d'intervenir en cas de :

- efforts expulsifs (contractions abdominales) vaines depuis 30 minutes
- perte des eaux depuis 30 minutes sans nouveau-né visible
- premier né depuis plus de 30 minutes et efforts expulsifs vains pour le second

Mais également si ... je suspecte un défaut de présentation ou j'observe des pertes malodorantes ou foncées.


PRÉSENTATIONS (A)NORMALES

Présentations normales du nouveau-né



La présentation « classique » est la présentation antérieure, à savoir la tête et l'encolure étendues entre les membres antérieurs permettant une dilatation progressive du col utérin (encadré vert). La présentation postérieure, membres étendus, est également considérée comme normale mais peut nécessiter une intervention, d'autant plus s'il s'agit d'un nouveau-né simple et de gros gabarit.

Présentations anormales du nouveau-né



Les présentations anormales sont variées et nécessitent systématiquement une intervention simple (repousser manuellement l'agneau et déplier un membre ou son encolure) voire plus technique (utiliser des cordes de mise-bas). Certaines représentent de vraies urgences comme le siège (encadré rouge). Le nouveau-né peut en effet « boire la tasse ».




CONSEILS

Si je prends la décision de tirer l'agneau / le chevreau, je pense à :

- maintenir la mère couchée, idéalement sur son flanc gauche
- exercer une traction en même temps que la brebis / chèvre pousse
- exercer une traction en direction du pis pour profiter de l'inclinaison du bassin
- vérifier la présence d'un frère ou d'une sœur en fouillant l'utérus

J'AI SORTI LE NOUVEAU-NÉ DE MES PROPRES MAINS ?

J'ENCHAÎNE LES ÉTAPES...



IL FAIT FROID ?

Je place sous lampe chauffante.

MAMAN A DU PIS ?

- Je palpe les deux quartiers.
- Je contrôle la présence de colostrum.
- Je m'assure que le(s) nouveau-né(s) aille(nt) au pis.
- Je contrôle le remplissage de l'abdomen du/des nouveau-nés.

COLOSTRUM

- Quantité : 100ml/kg sur les 6 premières heures de vie (dont 50 ml/kg en 1^{ère} heure)
- Fréquence : 3 ou 4 buvées

Besoin d'un conseil? Contactez-nous!

Tel: 083 23 05 15 - ext 4 / E-Mail: francois.claine@arsia.be