## À PARTIR DE QUAND RÉALISER LES TESTS ?

**Exemple de cinétique d'une vache gestante**




**LES PAG** (PROTÉINES ASSOCIÉES À LA GESTATION) **SONT DÉTECTABLES DÈS 28 JOURS APRÈS FÉCONDATION**

Remarque : Il faut attendre 60 jours après le précédent velage avant de tester la vache car les PAG de l'ancienne gestation peuvent être encore détectées.

## TARIF

- 6,50 € HTVA pour les cotisans **arsia+** (tarif 2024).

Arsia asbl

Allée des Artisans, 2 - 5590 CINEY
**Tél :** 083 23 05 15
**E-mail :** labo@arsia.be

Arsia asbl

# TEST DE **GESTATION** sur **PRISES DE SANG**

IDEXX LABORATORIES

Editeur responsable: ARSIA asbl - Décembre 2023

# TEST DE **GESTATION** sur **PRISES DE SANG**

## FIABILITÉ

Test réalisable **dès 28 jours** après saillie ou insémination.

## RÉACTIVITÉ

Une vache trouvée non gestante peut être remise à la reproduction ou réformée **au bon moment.**

## PRODUCTIVITÉ & RENTABILITÉ

En complément de votre suivi habituel de reproduction (surveillance des chaleurs, échographies...), cette démarche permet d'optimiser la **productivité** et donc la **rentabilité.**

## PRATIQUE !

Le test est réalisable sur la prise de sang de prophylaxie (ou à d'autres périodes : rentrée à l'étable ou avant de lâcher en pâture).

La prise de sang est parfois **moins risquée** et plus rapide pour l'opérateur que l'échographie (dans le cas de couloirs de contention par exemple).

*Le test repose sur la détection par test ELISA des PAG (Protéines Associées à la Gestation) dans le sérum des vaches. Prélèvement sur tube sec.*

## QUELLES PÉRIODES DE TEST, POUR QUELS OBJECTIFS EN ÉLEVAGE ALLAITANT ?

### À LA RENTRÉE À L'ÉTABLE

Identifiez les vaches ou les génisses vides avant qu'elles ne consomment la ration hivernale.

### AU LÂCHER EN PÂTURE

Pour un lot mis à la reproduction en hiver, identifiez les vaches vides avant de les mettre en pâture.

### DURANT LES CONTRÔLES ANNUELS

Demandez au laboratoire d'effectuer des tests de gestation sur vos prises de sang effectuées dans le cadre de bilan ou de maintien.

### AU CAS PAR CAS

Possibilité de tester une ou plusieurs vaches, n'importe quand, en cas de doute (par exemple lors d'un achat ou d'un départ vers l'abattoir).

## CONDITIONS D'UTILISATION

- **Test fiable dès 28 jours de gestation.**
- **Ne pas utiliser dans les 60 jours qui suivent un vêlage.**

**ATTENTION**, ce test ne permet pas de déterminer le stade de gestation, le sexe du fœtus, la présence d'une gémélité ni la l'absence de malformations.

## QUELS SONT LES RÉSULTATS POSSIBLES ?




## AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DE REPRODUCTION

- **Détection précoce** des vaches vides pour les remettre à la reproduction au plus vite.
- Les vaches vides peuvent être **réformées** en connaissance de cause.
- Utile aussi pour détecter les **pertes embryonnaires**
- Possibilité d'utilisation en complément des **échographies**.